


# Asma (Pediátrico)

## NCEM-PP-03



**(1)** Considere el tratamiento médico centrado en la familia. Mientras sea posible, de acuerdo a la condición del paciente, mantenga el paciente junto a sus padres o encargado.

**(2)** No obligue al niño a adoptar una posición específica, permítale adoptar una posición cómoda para él. Proteja las vías respiratorias de acuerdo a la posición corporal.

**(3)** Sibilancias (wheezes) son sonidos auscultatorios en la fase de espiración que se parecen al sonido de un pito. Usualmente, las sibilancias son simétricas en ambos pulmones.

**(4)** El uso combinado de Albuterol e Ipratropium es para una sola nebulización. Luego, de ser necesario, esta indicado administrar Albuterol 5mg / 3ml nebulizado hasta un máximo de tres dosis.

**(5)** El Sulfato de Magnesio será administrado en consulta con el control médico. Debe ser administrado a pacientes que, hasta este punto, presenten Bronco Espasmo severo.

### Señales que sugieren Bronco Espasmo serero:

-Apariencia alterada, Exhausto, Inhabilidad para reclinarse, Retracciones severas, Movimiento de aire disminuido.

### Transporte de Paciente:

-El transporte de estos pacientes debe ser a una facilidad médica que cuente con los servicios de sala de emergencias pediátrica.

-En pacientes críticamente enfermos debe considerar el transporte del paciente a una facilidad médica con unidad de intensivo pediátrico.