


# Crup (Pediátrico)

## NCEM-PP-04



(1) Considere el tratamiento médico centrado en la familia. Mientras sea posible, de acuerdo a la condición del paciente, mantenga el paciente junto a sus padres o encargado.

(2) No obligue al niño a adoptar una posición específica, permítale adoptar una posición cómoda para él protegiendo sus vías respiratorias.

(3) EL Crup afecta mayormente a infantes y niños entre 1-3 años de edad. El Crup es causado por un virus respiratorio y puede presentar síntomas días como la fiebre. Se caracteriza por la "Tos de perro o foca" y pudiera presentar dificultad respiratoria aguda con estridor.

**Signos de dificultad respiratoria: Taquipnea, retracciones, aleteo nasal, quejido y cabeceo.**

(4) La Epinefrina nebulizada será administrada en pacientes que presenten dificultad respiratoria y estridor al descanso (3 ampolletas de 1mg de Epinefrina 1:1,000 en 3 ml de NSS. Se puede utilizar la dosis de 1 ampolleta de 1mg de Epinefrina 1:1000 en 1 ml de NSS de ser necesario.

### Transporte de Paciente:

-El transporte de estos pacientes debe ser a una facilidad medica que cuente con los servicios de sala de emergencias pediátrica.

-En pacientes críticamente enfermos se debe considerar el transporte del paciente a una facilidad médica con unidad de intensivo pediátrico.